

Identifikace pacienta:

Příjmení a jméno:

Plátce ZP:

Datum odběru:

Čas odběru:

Diagnóza:

Lékař:

Zařízení (oddělení):

ANTIBIOTIKA

(označ)

 Gentamicin (450, 451) Amikacin (456, 457) Vankomycin (462, 463)

Odběr krve: I. (před podáním) datum: čas:

 Podání léku: množství: datum: čas:
 způsob aplikace: i.v.
 (označ) i.m.

doba aplikace:

Odběr krve: II. (po podání) datum: čas:

 Dávkovací schéma: množství: datum: čas:
 dávkovací interval:
 začátek podávání

Výška (cm) / hmotnost (kg):

Poznámka:
 Odběr krve na stanovení hladiny aminoglykosidových ATB (gentamicin, amikacin) a vankomycinu:
 I. bezprostředně před následující dávkou, kdykoliv během kontinuální infuze
 II. 1/2 h po skončení infuze
 1 h po i.m. aplikaci

Žádanka je určena jen pro farmakokinetické hodnocení; je nutné vyplnit všechny údaje týkající se podání léku, výšku a hmotnost pacienta. Hodnoty glomerulární filtrace si vyhledá laboratoř.

IMUNOSUPRESIVA

(označ)

 Kyselina mykofenolová (* 125)

Odběr krve: I. před podáním (12 h po večerní dávce)

II. 1/2 h po podání

III. 2 h po podání

 Léková kombinace: tacrolimus, sirolimus, jen kys. mykofenolová
 (označ) cyklosporin A
Poznámka:

Provádí se výpočet plochy pod křivkou (AUC) kyseliny mykofenolové, který se liší dle lékové kombinace - nutné označit.

● = K₃EDTA

Identifikace pacienta:

Příjmení a jméno:

Plátce ZP:

Datum odběru:

Čas odběru:

Diagnóza:

Lékař:

Zařízení (oddělení):

ANTIBIOTIKA

(označ)

 Gentamicin (450, 451) Amikacin (456, 457) Vankomycin (462, 463)

Odběr krve: I. (před podáním) datum: čas:

 Podání léku: množství: datum: čas:
 způsob aplikace: i.v.
 (označ) i.m.

doba aplikace:

Odběr krve: II. (po podání) datum: čas:

 Dávkovací schéma: množství: datum: čas:
 dávkovací interval:
 začátek podávání

Výška (cm) / hmotnost (kg):

Poznámka:
 Odběr krve na stanovení hladiny aminoglykosidových ATB (gentamicin, amikacin) a vankomycinu:
 I. bezprostředně před následující dávkou, kdykoliv během kontinuální infuze
 II. 1/2 h po skončení infuze
 1 h po i.m. aplikaci

Žádanka je určena jen pro farmakokinetické hodnocení; je nutné vyplnit všechny údaje týkající se podání léku, výšku a hmotnost pacienta. Hodnoty glomerulární filtrace si vyhledá laboratoř.

IMUNOSUPRESIVA

(označ)

 Kyselina mykofenolová (* 125)

Odběr krve: I. před podáním (12 h po večerní dávce)

II. 1/2 h po podání

III. 2 h po podání

 Léková kombinace: tacrolimus, sirolimus, jen kys. mykofenolová
 (označ) cyklosporin A
Poznámka:

Provádí se výpočet plochy pod křivkou (AUC) kyseliny mykofenolové, který se liší dle lékové kombinace - nutné označit.

● = K₃EDTA