

## Informovaný souhlas s aplikací očkovací látky COMIRNATY COVID-19 mRNA Vaccine proti nemoci COVID-19

Pojištěnec: ..... Narozen(a): .....

.....  
titul jméno příjmení

Rodné číslo (číslo pojištění): ..... / ..... Kód ZP: .....

Bydliště: .....

Tel. kontakt: ..... email: .....

Zákonný zástupce: ..... Vztah: .....

.....  
titul jméno příjmení (např. matka, otec, opatrovník aj.)

Narozen(a): ..... Bydliště: .....  
.....  
(liší-li se od bydliště pojištěnce)

Vážená paní, vážený pane,

pokud s tím budete souhlasit, bude Vám podána očkovací látka proti nemoci COVID-19.

### **Význam a výhody očkování proti nemoci COVID-19:**

Podání očkovací látky má zabránit, abyste onemocněl(a) nemocí COVID-19, kterou způsobuje virus SARS-CoV-2. Očkovací látka vyvolá přirozenou tvorbu protilátek a povzbudí imunitní buňky, aby Vás ochránily proti onemocnění COVID-19.

### **Informace o očkování proti nemoci COVID-19:**

K dosažení plného účinku je třeba podstoupit očkování 2 dávkami (základní schéma). Druhá dávka bude podána za 21 dní po podání první dávky, odložení 2. dávky je možné, ale dotyčný bude plně chráněn až za 14 dní po dokončení základního schématu. V případě podání 3. dávky se jedná o dávku posilující, tzv. přeočkování. Jedinou podmínkou pro podání 3. dávky je odstup 8 měsíců od 2. dávky, v případě rizikových pacientů může být ošetřujícím lékařem indikován kratší interval.

Pro dosažení maxim. benefitu vakcinace je velmi důležité, abyste podstoupil(a) aplikaci všech doporučených dávek. Termíny podání Vám sdělí lékař v očkovacím centru.

### **Způsob aplikace očkovací látky:**

Očkovací látka Vám bude podána injekčně do ramenního svalu. Používané injekce a způsob podání jsou obdobné jako u jiných druhů očkování.

### **Doba ochrany po očkování:**

Na základě současného stavu vědeckého poznání nelze zatím zcela přesně stanovit míru a dobu ochrany po očkování. V průběhu dalších let od zavedení očkování budou tyto informace upřesňovány.

Ochrana proti onemocnění COVID-19 nemusí být dostatečná do 14 ti dnů po podání druhé dávky očkovací látky. Do té doby je nutné se chovat podle doporučených hygienicko-epidemiologických postupů k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních. 3. dávka je posilující, zajistí vzestup protilátek, aby ochrana byla spolehlivá.

### **Účinnost očkování:**

U vakcíny Comirnaty byla v klinickém hodnocení prokázána cca 95% účinnost. Stejně jako v případě jiných očkovacích látek, ani vakcína proti nemoci COVID-19 nemusí ochránit úplně všechny očkované.

### **Pro koho je očkování doporučeno:**

Očkovat se mohou osoby ve věku 12 let a starší. Očkováni budou také osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19. Očkovat po prodělaném Covid-19 lze nejdříve za 90 dní, ochrana po prodělaném onemocnění je maximálně 180 dní.

Mírně zvýšená teplota nebo lehká infekce horních cest dýchacích, jako je nachlazení, nejsou důvodem k odložení očkování.

### **Kdy není vhodné očkování provádět:**

Očkovat by se nemělo v 1. trimestru těhotenství, ale pokud se tak stane, není to důvod k přerušení gravidity. Ve 2. a 3. trimestru očkovat lze, zde volíme individuální přístup, při kojení se očkování naopak doporučuje, abychom ochránili kojené dítě.

Očkování se doporučuje pečlivě zvažovat u osob, které v minulosti prodělaly závažnou celkovou alergickou reakci (tzv. anafylaxi) po jakékoli očkovací vakcíně.

Doporučení před očkováním**Doporučení konzultovat záměr očkování proti nemoci COVID-19 s praktickým či ošetřujícím lékařem, pokud:**

- jste měl(a) vážnou alergickou reakci na jiné očkování, léčivý přípravek nebo potraviny,
- máte oslabený imunitní systém v důsledku onemocnění nebo užíváte léky, které imunitní systém negativně ovlivňují; máte nyní akutní infekci, horečnaté nebo jiné závažné akutní onemocnění,
- máte problémy s krvácením, snadno se Vám tvoří modřiny nebo užíváte léky, které omezují srážlivost krve,
- myslíte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět.

Pokud máte po konzultaci se svým praktickým lékařem pochybnosti ohledně vhodnosti očkování kvůli Vaší specifické situaci (např. vzácné onemocnění, vzácná kombinace onemocnění nebo postižení atp.), neváhejte se poradit s Vaším odborným lékařem. O výše uvedeném informujte před očkováním očkovacího lékaře.

**Doporučení konzultovat záměr očkování proti nemoci COVID-19 s lékařem očkovacího centra, pokud:**

- máte závažný zdravotní stav nebo jinou specifickou situaci, kterou jste před očkováním konzultoval s Vaším praktickým lékařem nebo s odborným lékařem,
- jste měl(a) problémy po podání první dávky očkovací látky proti onemocnění COVID-19, jako je např. alergická reakce nebo jiná závažná nežádoucí reakce.

Pokud máte jakékoli další otázky k očkovací látce nebo k očkování, zeptejte se očkovacího lékaře.

Bezpečnost podání očkovací látky a možné nežádoucí účinky očkování:**Očkovací látka neobsahuje samotný virus a nemůže vyvolat onemocnění COVID-19.****Bezprostřední reakce po očkování:**

Závažná alergická reakce po očkování (anafylaxe) je extrémně vzácná a může nastat po jakémkoli očkování. Někteří lidé mohou mít po podání očkovací látky alergickou reakci, která se může projevit jako svědivá vyrážka, problémy s dýcháním, otok obličeje nebo jazyka. V případě, že se u Vás taková alergická reakce vyskytne, neprodleně kontaktujte lékaře očkovacího centra. Bez včasné pomoci lékaře může dojít k újmě na zdraví, ve výjimečném případě může být pacient(ka) také ohrožen(a) na životě. Abyste tak mohl(a) učinit, bude Vám doporučeno po očkování setrvat 30 minut na místě, kde se očkování provádí.

**Pozdější reakce na očkování:**

Očkovací látka může vyvolat nežádoucí účinky. Pokud se vyskytnou, jsou zpravidla lehké a odezní během několika málo dní.

- u více než jednoho očkování z deseti se může vyskytnout bolest nebo otok v místě vpichu injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů nebo kloubů, zimnice nebo horečka.
- u méně než jednoho očkování z deseti se může vyskytnout zarudnutí v místě vpichu injekce nebo pocit na zvracení.
- u méně než jednoho očkování ze sta se může vyskytnout zvětšení lymfatických uzlin nebo malátnost nebo jiné nežádoucí účinky.

Doporučení po očkování:**Bezprostředně po aplikaci očkovací látky:**

Po podání očkovací látky se doporučuje pečlivé sledování Vašeho zdravotního stavu zpravidla po dobu 15 minut, a to na místě, kde se provádí očkování. Vyvarujte se výraznější fyzické námahy dva dny po očkování.

**Později po aplikaci očkovací látky:**

V případě, že se po očkování u Vás vyskytne některý z nežádoucích účinků, informujte lékaře očkovacího centra.

Prohlášení očkované osoby:

Prohlašuji, že:

- o nemám žádné známky závažnějšího infekčního onemocnění (jako jsou kašel, rýma, horečka apod.),
- o nevztahují se na mne žádná karanténní opatření ve vztahu k nemoci COVID-19,
- o nevím o žádném jiném důvodu, který by bránil v podání očkovací látky (např. těhotenství),
- o neměl jsem v minulosti závažnější krvácivé projevy.

Prohlašuji, že jsem byl(a) srozumitelně informován(a) o veškerých shora uvedených skutečnostech a měl(a) jsem možnost klást doplňující otázky. Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení **souhlasím s aplikací očkovací látky.**

Za účelem zaslání elektronického certifikátu o absolvování aplikace očkovací látky COMIRNATY COVID-19 mRNA Vaccine proti nemoci COVID-19 souhlasím s předáním kontaktních údajů do registru ÚZIS-ISIN.

**V případě vyplnění nečitelných údajů nemůže být certifikát zaslán!**

Datum podpisu:..... Podpis očkované osoby (zákonného zástupce): .....

Razítko očkovacího centra a podpis:

Tento formulář ani žádná jeho část nesmí být reprodukována, publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vedení FN Plzeň.