

Informovaný souhlas s aplikací očkovací látky COMIRNATY COVID-19 mRNA Vaccine proti nemoci covid-19

Pojištěnec: Narozen(a):

titul	jméno	příjmení

Rodné číslo (číslo pojištění): / Kód ZP:

Bydliště:

Tel. kontakt: _____ Email: _____

Zákonný zástupce: Vztah:
 titul jméno příjmení (např. matka, otec, opatrovník aj.)

Narozen(a): Bydliště:
(liší-li se od bydliště pojištěnce)

Vážená paní, vážený pane, zákonný zástupce, opatrovníku,
pokud s tím budete souhlasit, bude Vám, Vašemu dítěti, či osobě svěřené podána očkovací látka proti nemoci covid-19.

Význam a výhody očkování proti nemoci covid-19

Podání očkovací látky má zabránit, abyste onemocněl(a) nemocí covid-19, kterou způsobuje virus SARS-CoV-2. Vakcína vyvolá přirozenou tvorbu protilátek a povzbudí imunitní buňky, aby Vás ochránily proti onemocnění covid-19.

Informace o očkování proti nemoci covid-19

K dosažení plného účinku je třeba podstoupit vakcinaci **2 dávkami** (základní schéma). Druhá dávka bude podána za 21 dní po podání první dávky, odložení 2. dávky je možné, ale dotýčný bude plně chráněn až za 14 dní po dokončení základního schématu. V případě podání 3. dávky se jedná se o dávku posilující, tzv. přeočkování. Jedinou podmínkou pro podání 4. dávky je odstup 4 měsíců od podání 3. dávky ve stanovených věkových skupinách, v případě rizikových pacientů může být ošetřujícím lékařem indikován jiný interval.

Pro dosažení plného efektu vakcinace je velmi důležité, aby proběhla aplikace všech doporučených dávek. Termíny podání Vám sdělí lékař v příslušné ambulanci Očkovacího centra.

Způsob aplikace očkovací látky

Vakcína je aplikována injekčně do deltového svalu horní části paže. Používané injekce a způsob podání jsou obdobné jako u jiných druhů očkování.

Doba ochrany po očkování

Na základě současného stavu vědeckého poznání nelze zatím zcela přesně stanovit míru a dobu ochrany po vakcinaci. V průběhu dalších let od zavedení očkování budou tyto informace upřesňovány.

Ochrana proti onemocnění covid-19 nemusí být dostatečná do 14 dnů po podání druhé dávky očkovací látky. Do té doby je nutné se chovat podle doporučených hygienicko-epidemiologických postupů k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních. Třetí dávka je tzv. posilující, zajistí dlouhodobější ochranu.

Účinnost očkování

U vakcíny Comirnaty byla v klinickém hodnocení prokázána cca 95% účinnost. Stejně jako v případě jiných očkovacích látek, ani vakcína proti nemoci covid-19 nemusí ochránit úplně všechny očkované.

Pro koho je očkování doporučeno

Očkovat se mohou osoby (včetně dětí) ve věku 5 let a starší. Očkovat se mohou i osoby, které prodělaly onemocnění covid-19. V případě prodělaného onemocnění covid-19 je zahájení vakcinace možné odložit o 3-6 měsíců. Ochrana po prodělaném onemocnění je maximálně 180 dní. Mírně zvýšená teplota nebo lehká infekce horních cest dýchacích, jako je nachlazení, nejsou důvodem k odložení očkování.

Ženy gravidní a kojící matky

Očkovací látka může být podávána ženám v průběhu celé gravidity, nezbytná je však vždy konzultace s registrujícím lékařem – gynekologem. Vakcína může být podávána i kojícím matkám, očkováním je chráněno současně i kojené dítě.

Alergické reakce v anamnéze

Očkování se doporučuje pečlivě zvažovat u osob, které v minulosti prodělaly závažnou celkovou alergickou reakci (tzv. anafylaxi) po jakékoli vakcíně.

Doporučení před očkováním

Konzultovat záměr očkování proti nemoci covid-19 s praktickým či ošetřujícím lékařem, doporučujeme vždy pokud:

- jste měl(a) vážnou alergickou reakci na jiné očkování, léčivý přípravek nebo potraviny,
- máte oslabený imunitní systém v důsledku onemocnění nebo užíváte léky, které imunitní systém negativně ovlivňují; máte nyní akutní infekci, horečnaté nebo jiné závažné akutní onemocnění,
- máte problémy s krvácením, snadno se Vám tvoří modřiny nebo užíváte léky, které omezují srážlivost krve,
- myslíte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět.

Tento formulář ani žádná jeho část nesmí být reprodukovány, publikováni a šířeni žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vedení FN Plzeň.

Pokud máte po konzultaci se svým praktickým lékařem pochybnosti ohledně vhodnosti očkování kvůli Vaší specifické situaci (např. vzácné onemocnění, vzácná kombinace onemocnění nebo postižení atp.), neváhejte se poradit s Vaším odborným lékařem. O výše uvedeném informujte před vakcinací očkovacího lékaře.

Pozor: V případě dětí ve věkové kategorii 5 až 11 let vyžadujeme vždy od registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost řádně vyplněný a podepsaný Anamnestický dotazník pro očkování dítěte.

Konzultovat záměr očkování proti nemoci covid-19 s lékařem Očkovacího centra doporučujeme vždy, pokud:

- máte závažný zdravotní stav nebo jinou specifickou situaci, kterou jste před očkováním konzultoval s Vaším praktickým lékařem nebo s odborným lékařem,
- jste měl(a) problémy po podání první dávky očkovací látky proti onemocnění covid-19, jako je např. alergická reakce nebo jiná závažná nežádoucí reakce.

Pokud máte jakékoli další otázky k očkovací látce nebo k vakcinaci, zeptejte se očkovacího lékaře.

Bezpečnost podání očkovací látky a možné nežádoucí účinky očkování

Očkovací látka neobsahuje samotný virus a nemůže vyvolat onemocnění covid-19.

Bezprostřední reakce po očkování

Závažná alergická reakce po očkování (anafylaxe) je extrémně vzácná a může nastat po jakémkoli očkování. Někteří lidé mohou mít po podání očkovací látky alergickou reakci, která se může projevovat jako svědivá vyrážka, problémy s dýcháním, otok obličeje nebo jazyka. V případě, že se u Vás taková alergická reakce vyskytne, neprodleně kontaktujte lékaře očkovacího centra. Bez včasné pomoci lékaře může dojít k újmě na zdraví, ve výjimečném případě může být pacient(ka) také ohrožen(a) na životě. Abyste tak mohl(a) učinit, bude Vám doporučeno po očkování setrvat 30 minut na místě, kde se očkování provádí.

Pozdější reakce na očkování

Očkovací látka může vyvolat nežádoucí účinky. Pokud se vyskytnou, jsou zpravidla lehké a odezní během několika málo dní.

- u více než jednoho očkování z deseti se může vyskytnout bolest nebo otok v místě vpichu injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů nebo kloubů, zimnice nebo horečka,
- u méně než jednoho očkování z deseti se může vyskytnout zarudnutí v místě vpichu injekce nebo pocit na zvracení,
- u méně než jednoho očkování ze sta se může vyskytnout zvětšení lymfatických uzlin nebo malátnost nebo jiné nežádoucí účinky.

Doporučení po očkování

Bezprostředně po aplikaci očkovací látky:

Po podání vakcíny se doporučuje pečlivé sledování Vašeho zdravotního stavu zpravidla po dobu 30 minut, a to na místě, kde se provádí očkování. Vyvarujte se výraznější fyzické námahy dva dny po očkování.

Později po aplikaci očkovací látky:

V případě, že se u očkování osoby po očkování vyskytne některý z nežádoucích účinků, informujte lékaře očkovacího centra.

Prohlášení očkované osoby (v případě dětí za očkovanou osobu zákonného zástupce či opatrovníka)

Prohlašuji, že:

- nemám žádné známky závažnějšího infekčního onemocnění (jako jsou kašel, rýma, horečka apod.),
- nevztahují se na mne žádná karanténní opatření ve vztahu k nemoci covid-19,
- nevím o žádném jiném důvodu, který by bránil v podání očkovací látky (např. těhotenství, závažná alergická reakce po očkování, problémy s dýcháním po jakémkoliv jiné injekci),
- neměl jsem v minulosti závažnější krvácivé projevy.

Prohlašuji, že jsem byl(a) srozumitelně informován(a) o veškerých shora uvedených skutečnostech a měl(a) jsem možnost klást doplňující otázky. Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení **souhlasím s aplikací očkovací látky.**

☐ Za účelem zaslání elektronického certifikátu o absolvování aplikace očkovací látky COMIRNATY COVID-19 mRNA Vaccine proti nemoci covid-19, souhlasím s předáním kontaktních údajů do registru ÚZIS-ISIN.

Certifikát o provedeném očkování si můžete kdykoliv stáhnout z aplikace: <https://ocko.uzis.cz/>

V případě vyplnění nečitelných údajů nemůže být certifikát zaslán!

Datum podpisu:

.....
podpis očkované osoby (zákonného zástupce, opatrovníka)

Razítko očkovacího centra a podpis: